

రబీ పరి యాజమాన్య పద్ధతులు

నారుమడి లో

- 100 చదరపు మీటర్లకు - 500 కేజీల పశువుల ఎరువు / కంపోస్టు వేయాలి.
- లీటరు సిటికి 1 గ్రా చొప్పున కర్మిండాజిమ్ కలిపిన మందు ద్రావణంలో 24 గంటల పాటు విత్తనాన్ని నాసబెట్టి మండె కట్టాలి.
- ముందుగా మొలకెత్తిన 25 కేజీల విత్తనాన్ని 100 చదరపు మీటర్లలో చల్లాలి.
- నారు మడిలో 2 కేజీల యూరియా + 3 కేజీల సూపర్ ఫాస్ట్ ప్రోట్ + 1 కేజీ పొట్టావ్ లను వేయాలి.
- నారు మడిలో కలుపు నివారణకు, నారు పోసిన 7-10 రోజులకు 300 మి.లీ బెంధియోకార్బ్ పిచికారి చేయాలి (లేదా) 200 మి.లీ బ్యూటాక్టోర్ మందును పాడి ఇసుకలో కలిపి చల్లాలి.
- నారు పోసిన 10 రోజులకు 600 గ్రా కార్బోప్లైరాన్ గుళికలను వేయాలి.

నాటే పొలంలో

- పచ్చి రొట్టు పైర్లను పండించి పొలంలో తొక్కొంచాలి.

నాటే 2/3 వారాలకు ముందు

- పొలాన్ని బాగా దుక్కి చేసి దమ్ము చేయాలి మూడవసారి నాటే ఒక వారం ముందు బాగా దమ్ము చేయాలి.

పరి నారు నాటి ముందు అఖరి దుక్కిలో

- యూరియా (35 కేజీలు) + సూపర్ ఫాస్ట్ (150 కేజీలు) + పొట్టావ్ (25 కేజీలు)
- (ప్రతి 3 సంవత్సరాల కొకసారి) జింక్ సల్ఫ్ ట్ (20 కేజీలు) వేయాలి
- 4-6 ఆకులు కల్గిన బలమైన ఆరోగ్యవంతమైన నారును నాటాలి.

నాటు దూరం : దీర్ఘకాలిక రకాలకు - 20 సెం.మీ వరుసల మధ్య -15 సెం.మీ వరుసలోని మొక్కల మధ్య

- స్వల్ప కాలిక రకాలకు - 15 సెం.మీ వరుసల మధ్య - 10 సెం.మీ వరుసలోని మొక్కల మధ్య
- పరినాట్లను 3 సెం.మీ కంటే లోతుగా నాటరాదు. ఒక్కొక్క దుబ్బుకు 2-3 మొక్కలు నాటాలి.
- నాటిన 4-6 రోజులకు : బ్యూటాక్టోర్ 1.2 లీటర్లు లేక 12 కిలోలు (లేదా) బెంధియోకార్బ్ 1.2 లీటర్లను పిచికారి చేసినట్టుతే పలురకాల కలుపు మొక్కలను నియంత్రించవచ్చును.
- నాటిన 15-25 రోజులకు : యూరియా 35 కేజీలు వెదజల్లాలి.

- ★ వేప పెండి పూసిన యూరియాను చల్లడం మంచిది. (యూరియా 1 భాగం + వేప పెండి 1/5 భాగం + తగినంత తారు)

సిటి యాజమాన్యం

- నారు నాటీ టప్పుడు - 2-3 సెం.మీ సీరు,
- నాటినప్పటి నుండి పైరు బాగా నిలదొక్కుకున్నంతవరకు - 5 సెం.మీ
- పిలకలు వేయు దశనుండి అంకురం ఏర్పడు దశవరకు - 2-3 సెం.మీ
- అంకురం ఏర్పడిన దశనుండి పంట కోయు 10 రోజుల ముందు వరకు - 5 సెం.మీ
- అంకురం ఏర్పడు దశలో
- 35 కేజీల యూరియా + 25 కేజీల పాటావ్ లను వేయాలి
- ఉల్లీకోడు నివారణకు - ఫిఫోనిల్ 2 మి.లీ/బక లీటరు సిటికి
- కంకి నల్లి నివారణకు - ప్రాఫెనోఫాన్ 2 మి.లీ/బక లీటరు సిటికి (లేదా) డైకోఫాల్ 5 మి.లీ/బక లీటరు సిటికి
- పాట్టకుట్టు నివారణకు - కార్బోండజిమ్ 1 గ్రాము/బక లీటరు సిటికి
- రెల్లరాల్చు పురుగు నివారణకు - ఎండోసల్వ్యూన్ + డైకోరోఫాన్
- పాముపాడతెగులు నివారణకు - ప్రావికొనటోల్ 1 మి.లీ/బక లీటరు సిటికి (లేదా) పొక్కాకొనటోల్ 2 మి.లీ/బక లీటరు సిటికి
- కాండంకుట్టుతెగులు నివారణకు - ప్రావికొనటోల్ 1 మి.లీ/బక లీటరు సిటికి (లేదా) పొక్కాకొనటోల్ 2 మి.లీ/బక లీటరు సిటికి (లేదా) కాపర్ ఆక్సిక్లోరైడ్ 3 గ్రాములు/బక లీటరు సిటికి
- ఆకుముడత నివారణకు - క్లోరోప్రైఫాన్ లేదా కార్బోవైడ్స్కోల్రైడ్ పిచికారి చేయాలి.
- కంకసల్లి నివారణకు ప్రాఫెనోఫాన్ 2 మి.లీ/బక లీటరు / డైకోఫాల్ మందులను పిచికారి చేయాలి.
- సుడితెగులు నివారణకు - బుఫ్రోఫాజిన్ (అప్లాట్) 300 మి.లీ / ఎకరాకు (లేక) ఇమిడాక్లోప్రైడ్ 50 మి.లీ 200 లీటర్ల సిటిలో
- అగ్గితెగులు నివారణకు - ఎకరాకు 120 గ్రాముల బ్రైస్కోటోల్ (లేక) 200 మి.లీ ఎడిఫెన్ఫాన్ 200 లీటర్ల సిటిలో
- కాండంతోలుచు పురుగు నివారణకు - కార్బోవైడ్స్కోల్రైడ్ 2 గ్రాములు / బక లీటరు సిటికి