

రాస్ - ఆచార్య రంగాకృషి విజ్ఞాన కేంద్రము

తిరుపతి

క్యాబేజీలో సమగ్ర సస్యరక్షణ

విత్తన శుద్ధి:

1. విత్తేముందు 100 గ్రా. విత్తనానికి 2 గ్రా. బ్రెకోడర్మా మరియు ఫైప్టోస్టెక్లిన్ 1 గ్రా. కలిపి విత్తుకోవాలి.

నారుమడి:

1. నారుకుళ్ళు నివారణకు కాప్టాన్ 2 గ్రా./1 లీ. తో నారుమడిని తడపాలి
2. చెదపురుగులు, చీమల నివారణకు కార్బోఫివరాన్ గుళికలు 0.5 కె.జి. / హెక్టార్ చల్లుకోవాలి.
3. నైలాన్ నెట్ను నారుమళ్ళపైన కప్పినచో క్యాబేజీ రెక్కల పురుగుల నుండి కొంతవరకు కాపాడవచ్చును.
4. బి.టి. మందును 1 గ్రా./లీ. నారుమడిలో 10 రోజులకు ఒక సారి పిచికారి చేసిన క్యాబేజీ రెక్కల పురుగులను నివారించ వచ్చును.
5. నల్లకుళ్ళు తెగులు నివారణకు మాంకోజిబ్ 2 గ్రా. / లీ. పిచికారి చేయాలి.

నాటేసమయంలో:

1. ప్రతి 25 క్యాబేజీ వరుసలకు 2 వరుసల చొప్పున ఆవముక్కలను నాటాలి.

నాటిన తరువాత: పొగాకు లద్దెపురుగు నివారణకు:

1. బ్రెకోగ్రామ బదనికలను 50000 / హె. వారానికి ఒకసారి నాటిన 15 రోజుల తరువాత విడుదల చేయాలి.
2. ఎస్.పి.వి. వైరస్ ద్రావణ 250 ఎల్.ఇ. / 200 లీ. నీరు నాలుగు సార్లు పిచికారి చేయాలి.
3. ఎకరానికి 20 చొప్పున పక్షి స్తావరాలి ఏర్పాటు చేయాలి.
4. 10 కి. ల తవుడు + 1 కి. బెల్లం పాకం + 500 గ్రా. కార్బారిల్ తగినంత నీటిలో కలిపి చిన్న చిన్న పుండలు చేసి 24 గం.లు పాటు ఉంచి సాయంత్రం వేళల్లో పొలంలో అక్కడక్కడ ఉంచాలి.

క్యాబేజీ రెక్కల పురుగులను నివారణ:

1. 5% వేపగింజల ద్రావణాన్ని 10 రోజుల వ్యవధిలో పిచికారి చేయాలి.
2. బి.టి. మందును 1 గ్రా./లీ. 10 రోజులకు ఒక సారి నాటిన 20 రోజుల తరువాత పిచికారి చేసిన క్యాబేజీ రెక్కల పురుగులను నివారించ వచ్చును.
3. పురుగు ఉధృతి ఎక్కువుగా వుంటే ఫ్లైనోశాడ్ 0.3 మి. లీ. పిచికారి చేయాలి.
4. పేసుబంక నివారణకు డైమిథోపిట్ 2 మి.లీ./లీ. పిచికారి చేయాలి.

నల్లకుళ్ళు నివారణకు :

1. వ్యాధి సోకిన ఆకులను తీసివేయాలి.
2. కాపర్ ఆక్సి క్లోరైడ్ 3 గ్రా. / లీ. నీరు పిచికారి చేయాలి.
- 3 . ఎకరాకు 5 కి.ల బ్లీచింగ్ పౌడర్ను భూమిలో వేయాలి.

టమోటా

విత్తన శుద్ధి:

1. విత్తేముందు 1 కె.జి. విత్తనానికి కాప్టాన్ 3 గ్రా. తో కలిపి విత్తుకోవాలి.

నారుమడి:

1. నారుకుళ్ళు నివారణకు కాపర్ ఆక్సి క్లోరైడ్ 3 గ్రా. / లీ. నీరు. తో నారుమడిని తడపాలి
2. చెదపురుగులు, చీమల నివారణకు కార్బోఫివరాన్ గుళికలు 0.5 కె.జి. / హెక్టార్ చల్లుకోవాలి.
3. నైలాన్ నెట్ను నారుమళ్ళపైన కప్పినచో తెల్ల దోమల నుండి కొంతవరకు కాపాడవచ్చును.
4. ఆకుమచ్చ తెగులు నివారణకు మాంకోజిబ్ 2 గ్రా. / లీ. పిచికారి చేయాలి.

నాటీసమయంలో:

1. ప్రతి 16 వరుసలకు 1 వరుసల చొప్పున బంతి మొక్కలను నాటీస కాయతొలుచు పురుగును నివారించవచ్చును.
2. ట్రైకోడర్మా 10గ్రా. / 500 మి.లీ. నీరు + ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 0.3 మి.లీ. / లీ. నీరు ద్రావణంలో వేర్లను ముంచి నాటుకొనినచో ఎండుతెగులు మరియు ఆకుతొలచు పురుగును నివారించవచ్చును.

నాటీస తరువాత:

1. తెల్ల దోమ నివారణకు ఇమిడాక్లోప్రిడ్ 0.3 మి.లీ. / లీ. నీరు నాటీస 10 రోజుల తరువాత పిచికారి చేయాలి.
2. పొగాకు లద్దెపురుగు నివారణకు:
ట్రైకోగ్రామ బదనికలను 2.5 లక్షలు / హె. వారానికి ఒకసారి పూత మొదలైన తరువాత విడుదల చేయాలి.
ఎన్.పి.వి. వైరస్ ద్రావణ 250 ఎల్.ఇ. / 200 లీ. నీరు నాలుగు సార్లు 15 రోజుల వ్యవధిలో పిచికారి చేయాలి.
3. బొమాటో మొక్కకు కర్ర పూతాలను నాటీస నెల తరువాత ఏర్పాటు చేయాలి.
4. ఎండుతెగులు సోకిన మొక్కలను, ఆకులను తీసివేయాలి.
5. ఆకుమచ్చ తెగులు నివారణకు మాంకోజిబ్ 2 గ్రా. / లీ. పిచికారి చేయాలి.
6. తామర పురుగు నివారణకు వేప నూనె 2.5 మి.లీ./లీ. నీరు కలిపి పిచికారి చేయాలి.
7. ఎర్ర నల్లి నివారణకు డైకోఫార్ 2.5 మి.లీ./ లీ. నీరు కలిపి పిచికారి చేయాలి.