

# రాస్

## ఆచార్య రంగా కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం

### రబీ కాలంలో వేరుజైనగ సాగు

( ఒక ఎకరాకు )

1. లోతుగా దుక్కి దున్ను కోవాలి
2. దుక్కిలో : పశువుల ఎరువు/కంపోస్టు - 4 టన్నులు
3. విత్తనంతో పాటు సాళ్ళలో : యూరియా - 17 కేజీలు  
సూపర్ ఫాస్ఫేటు - 100 కేజీలు  
మ్యూరేట్ ఆఫ్ ఫాటాష్ - 33 కేజీలు  
ప్రతి 3 సంవత్సరాల కొకసారి : జింకు సల్ఫేట్ - 20 కేజీలు  
వేరుపురుగు ఉండే ప్రాంతాల్లో : ఫారేట్ 10% గుళికలు - 6 కేజీలు
4. విత్తన మోతాదు :  
జె.ఎల్ - 24, కదిరి-4, తిరుపతి-4, నారాయణి - 70-80 కిలోలు  
టి.యం.వి.-2, తిరుపతి-1, తిరుపతి-3, - 55-60 కిలోలు  
కదిరి-3
5. విత్తన శుద్ధి : మాంకో జెబ్ (డైథేన్ యం-45) - 3 గ్రా / కేజీ  
విత్తనానికి (లేదా) కార్బండెజిమ్ (బావిస్టిన్) - 1  
గ్రా/ కేజీ విత్తనానికి (లేదా) బ్రెకోడెర్మా విరిడి - 4  
గ్రా/ కేజీ విత్తనానికి
6. విత్తే సమయం : నవంబరు 15 నుండి డిసెంబరు చివరి వరకు
7. విత్తు దూరం : 22.5 సెం.మీ. - వరుసల మధ్య  
10 సెం. మీ - వరుసలోని మొక్కల మధ్య
8. పొగాకు లద్దె పురుగు నియంత్రణకు పొలం గట్ల వెంబడి ఆముదం లేక పొద్దు తిరుగుడు విత్తనాలను కూడా నాటాలి.
9. విత్తిన 20 రోజుల తర్వాత : మొదటి కలుపు తీయాలి  
9 కేజీల యూరియాను పొలంలో చల్లాలి
10. పైరు తొలిపూత దశలో : కలుపు తీసి, 200 కిలోల జిప్సంను మొదళ్ళ వద్ద 5  
(విత్తిన 35-40 రోజులకు) సెం.మీ లోతులో వేయాలి.
11. నీటి తడులు : విత్తిన 20-25 రోజులకు మొదటి తడి ఇవ్వాలి.  
విత్తిన 45 నుండి 90 రోజుల వరకు నీటి ఎద్దడి  
లేకుండా చూడాలి

## 12. సస్య రక్షణ చర్యలు

a. రసం వీల్చు పురుగులు (పచ్చదోమ / పేను / తామర పురుగులు) నివారణకు

మోన్ క్రోటోఫాస్ 1.6 మి.లీ/ఒక లీటరు నీటికి (లేదా) కాన్విడార్ - 5 మి.లీ/10 లీటర్ల నీటికి  
(లేదా) డైమిథోయేట్ (రోగార్) 2 మి.లీ/1 లీటరు నీటికి

★ విత్తిన 60-70 రోజుల తర్వాత పేను పంట నాసిస్తుంది.

b. ఆకు ముడత పురుగు నివారణకు

క్వినాల్ ఫాస్ 2 మి.లీ / 1 లీటరు నీటికి (లేదా) మోన్ క్రోటోఫాస్ 1.6 మి.లీ / 1 లీటరు నీటికి (లేదా)  
క్లోరో వైరిఫాస్ 2.5 మి.లీ / 1 లీటరు నీటికి

c. పొగాకు లద్దె పురుగు నివారణకు

1. దీపపు ఎరలను పొలంలో ఉంచాలి.

2. 4 ఫిరమోస్ ఎరలను పొలంలో ఉంచాలి.

3. వక్షులు కూర్చోనుటకు వంగ కర్రలను పొలంలో అక్కడక్కడా నాటాలి.

4. 5 కేజీల తొడు + 1/2 కేజీ బెల్లం లేక చెరుకు మడ్డి + 250 మి.లీ క్లోరోవైరిఫాస్ + 3 లీటర్ల గోరువెచ్చటి  
నీరు కలిపి వుండలుగా తయారు చేయాలి. ఈరోజు ఉదయం తయారుచేసిన వుండలను మరుసటి  
రోజు సాయంత్రం పొలంలో వేయాలి.

5. ఎన్.పి.వి. ద్రావణము - 200 మి.లీ పిచికారి చేయాలి

6. చివరగా పొగాకు లద్దె పురుగు ఉధృతి ఇంకా వుంటే, క్వినాల్ ఫాస్ 2 మి.లీ లేక క్లోరోవైరిఫాస్ 2.5 మి.లీ  
1 లీటరు నీటికి కలిపి పిచికారి చేయాలి.

d. తిక్కా ఆకుపచ్చ తెగుళు నివారణకు

1. విత్తన శుద్ధి చేయాలి

2. మచ్చలు కనబడినప్పటి నుండి మ్యాంకోజెబ్ 2.5 గ్రా + కార్బండెజిమ్ 1 గ్రా / లీటరు నీటికి కలిపి 15  
రోజుల కొకసారి చల్లాలి.